

Kutyák prosztatata megbetegedései

Kutyák esetében viszonylag gyakran találkozunk vizeletürítési gondokkal. Természetesen mind kan, mind szuka kutyában sokféle ok (hormonális, bakteriális, beidégzési zavar, húgykőképződés stb.) vezethet nehezített vizeléshez vagy éppen a vizelet csepegéséhez, netán véres vizelet ürítéséhez.



Ha azonban idősödő, nem ivartalanított, kan kutyánk esetében jelentkeznek vizelési panaszok, mindenképp gondoljunk a prosztatára, mint lehetséges háttér okra is.

A prosztatata anatómiailag a húgycső, húgyhólyagból kiinduló kezdeti szakasza körül helyezkedik el, gyakorlatilag magába foglalva a húgycső csatornáját. Két lebenyével a húgycsővet körülölelve helyezkedik el a medence üregében.

A prosztatata egy járulékos nemi mirigy, mely a here által termelt hím nemi hormonok hiányában elszorvad, méretében csökken. Kutyában, az emberhez hasonlóan idősebb korban gyakran előfordul a prosztatata jóindulatú megnagyobbodása,

mely vizeletürítési zavarokhoz, illetve súlyosabb esetekben akár bélsárürítési zavarokhoz is vezethet. Mivel a fentebb leírtak szerint hím



nemi hormon hiányában a prosztatata elszorvad, ezt a kellemetlen, korrallal járó megbetegedést kan kutyáinknál mielőbbi ivartalanításával tudjuk leginkább megelőzni. Vannak gyógyszeres megoldások is a megnagyobbodott prosztatata kezelésére, de egyik sem olyan hatékony és mellékhatásmentes, mint az ivartalanítás.

A prosztatata megnagyobbodás tünetei, melyeket otthon észlelve mielőbb érdemes állatorvoshoz fordulni, a vizelet nehezített, szakaszos ürítése, vizeletcsepegés, véres vizelet. Ezek az esetek, ha jóindulatú prosztatata megnagyobbodásról van szó, szépen és jól gyógyíthatók, ha időben szakszerű ellátásban részesül a páciens. Kasztáció után a gyjából három hét elteltével a szervezetből kiürülő nemi hormonok következtében a prosztatata mérete jelentősen

csökken, megszüntetve ezzel a vizelési problémákat fenntartó okot.

A prosztatának vannak egyéb, súlyosabb megbetegedései is, melyeknek a gyógyítása már sokkal nehezebb, illetve rosszabb kórjósággal bírnak. Ilyenek lehetnek például a prosztatata tályog, prosztatata gyulladás vagy a prosztatata rosszindulatú daganata. Ezek is hasonló tüneteket okoznak kezdetben mint a már említett jóindulatú társuk, ezért állatorvosi kiegészítő vizsgálatok (ultrahang, vérlabor, röntgen stb.) szükségesek ezek elkülönítésére.

Állatkórházunkban számos fejlett kiegészítő vizsgálati eszközzel állunk rendelkezésükre kutyájuk problémáinak feltérképezéséhez és szakszerű megoldásához.

Dr. Szolnoki János

Állatkórházunk hosszú nyitvatartással - 8-20h-ig, (06-26-317-532 vagy 06-30-9370-863) és állandó éjjel-nappali és hétvégi ügyelettel (06-30-66-26-849) várja Önöket és kedvenceiket Szentendre központjában.

Folyamatos akciókkal, törzs-páciens kedvezményekkel,

házi állatorvosi szolgálattal - kiszállásokkal -, kutyakozmetikával, kutya -macska panzióval és sokféle szakrendeléssel,

kiváló műszerezettséggel, több mint 20 év tapasztalattal és fiatalos lendülettel állunk az Önök rendelkezésére, több mint 120 m²-en!

Szentendrei Rendelőintézet és állatkórház

2000 SZENTENDRE, RÓMAI SÁNC 2/B

DR. SZOLNOKI JÁNOS

06-30-937-0863

vagy 06-26-317-532

Éjjel-nappal, hétvégén,

ünnepnap folyamatos ügyelet:

06-30-66-26-849

Másik rendelő:

2012 TAHI, SZENTENDREI ÚT 6.

06-26-385-152

www.hegyvidekilkin.fw.hu