


Nyári bőrgyulladás hot-spot

A heveny váladékozó bőrgyulladás vagy hot spot gyakori elváltozás kutyában. A "hot spotok" hirtelen jelenhetnek meg, és gyorsan nagy vörös gyulladt elváltozásokká alakulhatnak rövid idő alatt. A hot spot jelentése= forró folt. A „hot spot” tulajdonképpen a bakteriális eredetű, gennyes bőrgyulladások (pyoderma) egy típusa, felületes gennyes bőrgyulladás (felületes pyoderma). Azaz a bőr gennyesedése, „csak” a bőr legfelső rétegét, a hámréteget érinti.



Előfordulás

Az elváltozás nagytű, dús aljszőrzetű kutyákban fordul elő, mint a német juhászkutya, újföldi, bernáthegyi, csau-csau. Ezen kívül a labrador és a golden retriever fajták is gyakran érintettek. Gyakrabban találkozunk hot spottal nyáron vagy meleg időben, egyes vizsgálatok szerint a 4 év alatti kanokban fordul elő legtöbbször.

Tünetek

Rendszerint, nagy, hámiányos, gyulladt és vérző bőrterület. Az elváltozott terület nedves és fájdalmas, majd elkezdi terjedni a folyamatos nyalás, rágás miatt.

Jellegzetes, hogy a kiterjedt, súlyos viszkető bőrelváltozás csupán néhány óra alatt, hirtelen alakul ki. Az állat kíméletlenül nyalja, rágcsálja a területet, tulajdonképpen „mágának” alakítja ki a bőrtünetet. Leggyakrabban a comb külső oldalán vagy az ágyéki területen, ritkábban a fültőnél vagy a pofatájékon jön létre egy kb. 5-15 cm átmérőjű foltoszerű bőrelváltozás, amely jól körül határolt, kivörösödött, kezdetben a nyáltól és a savótól nedvesen fénylő, később pörkké száradt gennyel fedett. A szőrzetet felette

az állat vagy kitépi vagy az a nyáltól, gennyttől összetapad. Előfordulhat, hogy - amennyiben az elváltozást nem kezelik idejében - néhány nap alatt tovaterjed és hatalmas egybefüggő bőrfelületet fog érinteni. Különösen súlyos komplikációt jelenthet nyári időszakban a légynyüvesség. Ugyanis a házi légy a nedves, szőrtelen bőrterületre leteheti petéit, és a bőrben kikelhetnek a légylárvák, amelyeket „légynyüveknek” hívunk. Ezt megelőzendő, lehetőleg a tünetek észlelésekor azonnal forduljunk állatorvoshoz!

A kialakulás oka

A hot spot kialakulásnak pontos oka nem tisztázott. A dús aljszőrzet „befülledése” szerepet játszhat, ezen kívül feltételezhető, hogy egyfajta heveny allergiás reakció, mert atópiás vagy bolhanyál-allergiás kutyák bizonyítottan jóval hajlamosabbak hot spot kialakulására.

A hot spot igen gyakran a bolhanyál-allergia jellegzetes megnyilvánulása kutyáknál. Fontos tudni, hogy a bolha nyálában található anyagokra túlérzékeny egyedek már egy bolha csípésére is ilyen heves, súlyos bőrelváltozással reagálhatnak, nem szükséges nagyszámú bolha jelenléte. Csupán egy bolha megtalálása esetén is alapos bolhairtást kell végezni minden együtt tartott állaton és a környezetben is. Előfordul, hogy a végbélnyílás körül elhelyezkedő, ún. perianális mirigyek (köznapi szóhasználatban „bűzmirigyek”) gyulladása váltja ki a hot spot megjelenését.

Azonban a fentiekben felsorolt háttér okokat nem minden esetben sikerül azonosítani, előfordul, hogy ezek (szőrzet befülledése, bolhásság, bűzmirigy-gyulladás)

hiányában is pyotraumas dermatitisz jön létre. Amennyiben az állapot rendszeresen kiújul, érdemes kivizsgálni az eleségallergia és a belégzési allergia (atópia) lehetőségét, mint hajlamosító okokat.

Diagnózis

A diagnózis általában a jellegzetes kórelőzmény és a tünetek alapján felállítható, a bőrelváltozásról vett lenyomatot kenet segítségével alátámasztható. Ebben nagyszámú kerek alakú (ún. „coccoid”) baktériumot lehet azonosítani.

Kezelés

A hot-spot „ijesztő” megjelenése ellenére jól kezelhető. Elsősorban az esetleges kiváltó okokat kell azonosítani és kezelni (pl.: bolhairtás, bűzmirigyek tisztítása). Ezt követően a szőrzetet le kell nyírni az érintett bőrterületen, a bőrfelület külső kezelése hatékonyan csak szőrnyírás után lehetséges. A területet le kell tisztítani és kíméletlen fertőtlenítőszerrel kezelni, a gyógyulást kombinált összetételű kenőcsökkel lehet segíteni. Gyors hatású injekciós viszketéscsillapító és gyulladáscsökkentő hatóanyag szükséges, hogy az állat kellemetlen érzését mihamarabb enyhítsük és, hogy minél előbb megakadályozzuk a terület további traumáját. Általában 7-10 napig szükséges a gyulladáscsökkentő és az antibiotikum-terápia.

Dr. Szolnoki János

Szentendrei Rendelőintézet és állatkórház

2000 SZENTENDRE, RÓMAI SÁNC 2/B

DR. SZOLNOKI JÁNOS

06-30-937-0863

vagy 06-26-317-532

Éjjel-nappal, hétvégén,

ünneppnap folyamatos ügyelet:

06-30-66-26-849

Másik rendelő:

2012 TAHI, SZENTENDREI ÚT 6.

06-26-385-152

www.hegyvidekilkin.fw.hu

Állatkórházunk hosszú nyitvatartással - 8-20h-ig,

(06-26-317-532 vagy 06-30-9370-863)

- és állandó éjjel-nappali és hétfégi ügyelettel

(06-30-66-26-849)

várja Önöket és kedvenceiket

Szentendre központjában.

Folyamatos akciókkal, törzs-páciens kedvezményekkel, házi állatorvosi szolgálattal - kiszállásokkal -, kutyakozmetikával, kutya -macska panzióval és sokféle szakrendeléssel, kiváló műszerezettséggel, több mint 20 év tapasztalattal és fiatalos lendülettel állunk az Önök rendelkezésére, több mint 120 m²-en!